

Lo Screening per l'Ambliopia è uno screening visivo mirato ad identificare precocemente l'Ambliopia.

L'Ambliopia, detta anche "occhio pigro", è il termine con cui viene definito un occhio apparentemente normale, ma che in realtà "non funziona". Se non identificata e corretta entro i 6 anni di età, l'Ambliopia causa una visione incompleta dell'occhio colpito.

Per scoprire se un bambino non vede con uno e con entrambi gli occhi, è indispensabile che l'esame della vista venga eseguito da una persona adeguatamente preparata. Numerosi studi in letteratura attestano che quanto più precocemente si esegue il test e si identifica il problema, più facilmente il difetto può essere corretto e la funzione recuperata.

Per tale motivo, in cui il bambino è scarsamente collaborante, il Pediatra di Libera Scelta, che conosce il bambino dalla nascita, è la figura più indicata per l'esecuzione del test, in modo da intercettare (entro il 5° anno) i difetti visivi nella popolazione infantile con la possibilità di intraprendere precocemente interventi mirati. Così si assicura una risposta assistenziale ottimale al bisogno di salute della popolazione.

Ai fini dell'esecuzione del test nell'ambulatorio del Pediatra di Libera Scelta dovrà essere presente il seguente materiale:

1. OTTOTIPO-TABELLONE particolare in cui il bambino deve riconoscere figure semplici ed oggetti di comune riscontro, a cui può dare una sua interpretazione. Deve essere posto in posizione luminosa a distanza di 3 metri dal soggetto;

2. occhialini o apposite coperture per gli occhi;

oppure, attrezzature e metodi scientificamente equivalenti (es. Stereotest di Lang).

Non servono per questa prima fase dello screening né gocce né strumenti particolari, l'ambiente deve essere tranquillo ed accogliente, il bambino deve leggere varie figurine progressive con ciascun occhio. L'ambulatorio del Pediatra di Libera Scelta è ambiente idoneo purché tranquillo e silenzioso nel momento dell'esecuzione del test (accessi su prenotazione in fasce orarie dedicate).

Il bambino va inviato al 2° livello in caso di chiara positività del test.